herpy

GEKKOER

Rhynchoedura ornata

Rhynchoedura ornata er en liten, slank og nattaktiv gekko fra de sandige ørkenene i vestlige og sentrale Australia. Den har en spiss snute med et nebblignende preg, lever på bakken og spiser mest termitter. Det finnes nesten ingen kunnskap om stell av arten, så veiledningen bygger på leveområdet og på slektninger fra samme strøk.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Western beaked gecko Tidligere navn: *Diplodactylus paraornatus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-6 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**40 × 25 × 25 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Varmeplass	**30-34 °C**
Temperatur, natt	**16-22 °C**
Luftfuktighet	**30-45 %**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**10-12 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**46-60 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Rhynchoedura ornata*, så anbefalingene her bygger på leveområdet i den australske ørkenen og på den nært beslektede *Diplodactylus galeatus*, som bor i samme type landskap.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 25-28 °C, med et varmt sted på 30-34 °C, for eksempel under en liten lampe over en flat stein. Mål alltid med et digitalt termometer, for varmen fra en pære varierer mye.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Rhynchoedura ornata kommer fra tørre strøk og må holdes tørt: sikt mot 30-45 % luftfuktighet. Terrariet må ventileres godt, og bunnen må være tørr.

LYS OG UVB

Rhynchoedura ornata er nattaktiv og har ikke noe dokumentert behov for UVB. Gir du UVB likevel, bør det være et svakt lys (Ferguson-sone 1) med mye skygge, slik at gekkoen kan trekke seg helt unna.

FÔRING

Rhynchoedura ornata lever i naturen mest av termitter og dessuten av maur. Termitter er sjeldne som fôrdyr, så tilby små, bløte fôrinsekter: nyklekte og små siriss, bananfluer, spretthaler og små kakerlakker.

ATFERD OG HÅNDTERING

Rhynchoedura ornata er et rolig, skjult og nattaktivt dyr. Om dagen ses det nesten ikke, og om natten kan det sees løpe rundt på sanden på jakt. Det er raskt og kan lett slippe unna hånden, og halen kastes ved fare.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.