herpy

GEKKOER

# *Saurodactylus brosseti*

*Saurodactylus brosseti* er en svært liten, bakkelevende gekko fra det vestlige Marokko. Kroppen måler omtrent 3 cm fra snute til kloakk, og den er aktiv om dagen og i skumringen. Arten er et kompleks av skjulte arter og nesten ukjent i fangenskap, så veiledningen bygger på klimaet i utbredelsesområdet.

Familie: Sphaerodactylidae  Engelsk: Morocco lizard-fingered gecko  Tidligere navn: *Saurodactylus mauritanicus brosseti; Saurodactylus fasciatus brosseti*  Publisert 16. november 2026

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **3 cm**<br>snute-kloakk-lengde |
| Levealder | **5-10 år** |
| Aktiv | **Om dagen og i skumringen** |
| Levevis | **Bakkelevende** |
| Biotop | **Halvørken og klippeterreng** |
| Vanskelighetsgrad | **Erfaren** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **40 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H for 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **22-28 °C** |
| Varmeplass | **30-32 °C** |
| Temperatur, natt | **12-18 °C** |
| Luftfuktighet | **40-60 %** |
| UVB | **Anbefalt**<br>Ferguson-sone 1 |
| Kosthold | **Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Alene eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Kullstørrelse | **1 egg** |
| Inkubasjon | **60-90 dager**<br>ved 24-28 °C |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke listet** |
| EU-vedlegg | **Ikke listet** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Stell i korte trekk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finnes nesten ingen kunnskap om stell av *Saurodactylus brosseti*. Klimaet i utbredelsesområdet er middelhavsaktig med varme, tørre somre og milde, fuktigere vintre, og arten er en svært liten, bakkelevende gekko. |
| **TEMPERATUR** | Om dagen holdes bunnen på 22-28 °C med et lite varmested på 30-32 °C under en svak spotlampe styrt av en termostat. Om natten faller temperaturen til 12-18 °C. |
| **LUFTFUKTIGHET OG VANN** | Luftfuktigheten i leveområdene er ikke dokumentert; 40-60 % passer til klimaet. |
| **LYS OG UVB** | *Saurodactylus brosseti* er aktiv om dagen og i skumringen. |
| **FÔRING** | I naturen lever arten av små leddyr. Fôrdyrene må være svært små, ikke større enn dyrets hode: spretthaler, bananfluer, nyklekte siriss og små skrukketroll. |
| **ATFERD OG HÅNDTERING** | Arten jager som en bakholdsjeger: den sitter stille og slår til når et lite insekt kommer forbi. Atferden i fangenskap er ikke dokumentert. Hold dyret enkeltvis eller et par i et romslig terrarium med mange skjul. |
| **NATURLIG UTBREDELSE** | Marokko. |

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/saurodactylus-brosseti