herpy

GEKKOER

Sphaerodactylus argus

En liten, dagaktiv dverggekko fra Jamaica og øyene San Andrés og Providencia, bare drøyt 6 cm lang med halen. *Sphaerodactylus argus* er brunaktig med gule prikker og streker på hodet, lever i tørr skog og løvlag og kan holdes parvis i et lite, tett terrarium.

Familie: Sphaerodactylidae Engelsk: Ocellated gecko Tidligere navn: *Sphaerodactylus argus andresensis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**20 × 20 × 20 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**6-10 mnd.**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**100 dager** ved 28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Sphaerodactylus argus*, men arten er lett å holde og få til å yngle. Den stelles som de beslektede *Sphaerodactylus elegans* og *Sphaerodactylus macrolepis*, men litt tørrere.

TEMPERATUR

Om dagen skal det være 26-28 °C. Et lysstoffrør kan gi den varmen som trengs, så en spotlampe er ikke nødvendig og kan lett overopphete et lite terrarium.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 50-60 %, lavere enn for de fleste andre dverggekkoer, fordi arten lever på tørre steder. Det er nok å spraye terrariet annenhver dag når det står en liten, lav vannskål framme.

LYS OG UVB

Gekkoen er dagaktiv. Ha lyset på 12 timer om dagen vår og sommer og 10 timer om vinteren. Et lysstoffrør eller en kompaktlysstoffpære i dagslysfarge er nok og gir samtidig den varmen som trengs.

FÔRING

Gekkoen er insektetende, og alt fôr må være lite, høyst så stort som dyrets hode. Voksne tar små siriss, små skrukketroll, store bananfluer (*Drosophila hydei*), voksmøll og voksmøllarver.

ATFERD OG HÅNDTERING

Hold arten enkeltvis eller som et par. To hanner må ikke settes sammen, fordi de slåss.

NATURLIG UTBREDELSE

Jamaica og Colombia.