herpy

GEKKOER

Sphaerodactylus torrei

En liten, dagaktiv gekko fra det sørøstlige Cuba med markant forskjell på kjønnene: hannen har gult hode og knallorange hale, hunnen er lys med mørke tverrbånd. *Sphaerodactylus torrei* blir bare omtrent 8 cm inkludert hale, legger ett egg om gangen og krever små fôrdyr og et tett lukket terrarium.

Familie: Sphaerodactylidae Engelsk: Barbour's least gecko Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**8 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Varmeplass	**31-32 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1 egg**
Kull per år	**1-4**
Inkubasjon	**80-90 dager** ved 26-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par av *Sphaerodactylus torrei* kan holdes i et terrarium på 60 × 45 × 45 cm (lengde × bredde × høyde). Et enkelt dyr klarer seg i litt mindre. Dyrene er territorielle, så hold enten ett dyr eller ett par.

TEMPERATUR

Om dagen skal det være 26-28 °C, og et lite område kan i sommerhalvåret nå 31-32 °C. Om natten faller temperaturen til omtrent 24 °C. Til en kjølig vinterperiode kan natten senkes til omtrent 18 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Hold den relative luftfuktigheten på omtrent 70-80 % ved å sprøyte terrariet daglig eller annenhver dag. For beslektede arter i slekten oppgis litt lavere verdier på 60-70 %, så lufta kan gjerne tørke litt opp mellom sprøytingene.

LYS OG UVB

Sphaerodactylus torrei er dagaktiv, og et svakt UVB-lys i Ferguson-sone 1 anbefales. Bruk et UVB-rør med lav styrke over den ene halvdelen av terrariet, så det alltid er skygge.

FÔRING

Sphaerodactylus torrei lever av smått, levende bytte. I naturen er det små siriss, møll, fluer og billelarver, og i fangenskap passer små siriss, bananfluer, små voksmøllarver og små larver av svart soldatflue.

ATFERD OG HÅNDTERING

Sphaerodactylus torrei er territoriell og aggressiv, så den holdes enkeltvis eller som ett par med mye skjul og plass. Dyrene er små, raske og blir lett stresset av håndtering, så de er dyr å se på, ikke å ta opp.

NATURLIG UTBREDELSE

Cuba.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/sphaerodactylus-torrei