herpy

GEKKOER

Middle Eastern short-fingered gecko

Stenodactylus doriae

En av de største artene i slekten *Stenodactylus*: en slank, nattaktiv bakkelever med lange bein og frynsete tær, som graver seg ned i sanden om dagen. Det finnes bare lite kunnskap om stell, men arten kan holdes som sine nærmeste slektninger i et tørt sandterrarium.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Ceramodactylus doriae; Ceramodactylus major; Stenodactylus major*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**5-8 cm** snute-kloakk-lengde
Vekt	**5-11 g**
Levealder	**9-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Ørken**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 20 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**35-38 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**8 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**60-80 dager** ved 27-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Stenodactylus doriae*. Oppsettet følger de nærmeste slektningene *Stenodactylus petrii* og *Stenodactylus sthenodactylus*, som stammer fra de samme ørkenene.
TEMPERATUR	Om dagen skal det være 24-29 °C i terrariet og 35-38 °C på det varmeste stedet, for eksempel over en varmematte eller et varmebånd under bunnen eller under en lampe i den ene enden.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luften skal være lav til moderat fuktig, omtrent 40-60 %. Spray en del av terrariet lett om kvelden en eller to ganger i uken, slik at det kommer fuktige flekker og vanndråper, og la resten være tørt.
LYS OG UVB	Arten er nattaktiv og kan leve uten UVB når den får kalk med D3-vitamin gjennom fôret. Et svakt UVB-lys over en del av terrariet er valgfritt så lenge dyrene kan grave seg ned i skygge.
FÔRING	Grunnfôret er levende insekter, mest sirisser, supplert med voksmøllarver, melormer, mini-melormer og flygeudyktige bananfluer. Insektene må høyst være like brede som gekkoens hode. Fôr om kvelden, flere ganger i uken.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Stenodactylus doriae* er ikke til håndtering. Den er rask og skjør, og halen kan kastes av. Dyrene kommer frem etter mørkets frembrudd og tilbringer dagen i gangene sine. Hannene kan gi lyd fra seg.
NATURLIG UTBREDELSE	Saudi-Arabia, Qatar, Iran, Irak, Israel, De forente arabiske emirater, Oman, Jordan og Kuwait.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/stenodactylus-doriae