herpy

GEKKOER

Strophurus ciliaris

Strophurus ciliaris er en slank, spinkel gekko fra det indre og nordlige Australia med lange pigger over øynene, piggete hale og en sterkt farget munn. Den klatrer rundt i busker og spinifex, soler seg gjerne og kan sprøyte en illeluktende væske fra halen hvis den blir truet.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Northern spiny-tailed gecko Tidligere navn: *Diplodactylus ciliaris* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-15 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**6-10 år**
Aktiv	**Om dagen, i skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Halvørken**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-29 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-25 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-24 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Kull per år	**6-10**
Inkubasjon	**55-65 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Høyden betyr mer enn bunnarealet, fordi *Strophurus ciliaris* er en klatrer. Enkeltdyr, par og trioer kan holdes i terrarier på 30 × 30 × 45 cm (lengde × bredde × høyde) eller større, og det er et godt minimum for ett voksent dyr.

TEMPERATUR

Terrariet til *Strophurus ciliaris* skal ha en varm sone øverst og en kjøligere sone nederst. Gi et varmt punkt på omkring 32 °C høyt oppe og 25-27 °C ved bunnen om sommeren.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Strophurus ciliaris skal ha lav luftfuktighet. Konkrete tall er ikke dokumentert, men 30-50 % passer til artens tørre leveområder.

LYS OG UVB

Strophurus ciliaris er aktiv i skumringen og om natten, men soler seg også om dagen. UV-lys er sannsynligvis gunstig, selv om dyr også har levd lenge uten. UVB anbefales derfor.

FÔRING

Strophurus ciliaris lever av leddyr og er ikke kresen. Voksne dyr får sirisser, kakerlakker og andre insekter i passende størrelse tre ganger i uken, gjerne oppfôret med grønnsaker og insektfôr et døgn eller to i forveien.

ATFERD OG HÅNDTERING

Strophurus ciliaris er nysgjerrig og dristig ved fôring og kommer ofte fram for å møte insektene, men den blir lett stresset av håndtering og er ikke et dyr som skal tas opp hver dag.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.