herpy

GEKKOER

Strophurus williamsi

Strophurus williamsi er en liten trelevende gekko fra det tørre innlandet i det østlige Australia. Ryggen og halen er besatt med gulorange pigger, og når den blir truet, sprøyter den en seig, illeluktende væske ut av halen. Den soler seg gjerne om dagen, men jakter mest i skumringen og om natten. Det finnes bare få pålitelige stelleopplysninger om akkurat denne arten, så den egner seg best for erfarne holdere.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Eastern spiny-tailed gecko Tidligere navn: *Diplodactylus williamsi* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**4-10 år**
Aktiv	**Om dagen, i skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-25 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Kull per år	**2-5**
Inkubasjon	**43-80 dager** ved 27-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes nesten ingen utførlige stellveiledninger for *Strophurus williamsi*, så målene her bygger på erfaringer med pigghalegekkoene generelt.

TEMPERATUR
Strophurus williamsi er varmekrevende og lever i et klima med store døgnvariasjoner. Bruk en dagtemperatur på 25-30 °C i terrariet og et solested på omkring 30-32 °C, som gekkoen kan søke mot og forlate igjen.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
For *Strophurus williamsi* skal luftfuktigheten være moderat, omkring 40-60 %, og terrariet skal tørke helt opp i løpet av dagen.

LYS OG UVB
Strophurus williamsi soler seg i naturen, så den har nytte av UVB.

FÔRING
I naturen lever *Strophurus williamsi* av leddyr, især sirisser, gresshopper, møll, edderkopper og termitter. Gi i fangenskap en variert blanding av små fôrinsekter som sirisser, små kakerlakker og små gresshopper.

ATFERD OG HÅNDTERING
Strophurus williamsi er mest et dyr å se på. Den er rask og nervøs og bør ikke håndteres mer enn strengt nødvendig.

NATURLIG UTBREDELSE
Australia.