herpy

GEKKOER

Thecadactylus rapicauda

En av Amerikas største gekkoer: en nattaktiv lurejeger uten bevegelige øyelokk, med loddrette pupiller, blå tunge og en hale som vokser ut tykk som en nepe etter et tap. Arten er utbredt fra Mexico til Brasil, men er sjelden i terrarier, og det finnes bare få pålitelige opplysninger om stell.

Familie: Phyllodactylidae Engelsk: Turnip-tailed gecko Tidligere navn: *Gekko rapicauda; Gekko laevis; Platydactylus theconyx* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**9-13 cm** snute-kloakk-lengde
Vekt	**16-40 g**
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Varmeplass	**30-31 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**150-200 dager** ved 24-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare få erfaringer med arten i fangenskap, så målene bygger på de generelle kravene til nattaktive, klatrende gekkoer fra fuktige strøk.

TEMPERATUR

Arten er aktiv innenfor et forholdsvis snevert temperaturområde. Om dagen passer 25-28 °C, og et litt varmere sted på 30-31 °C øverst i terrariet gir dyret mulighet til å velge.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten skal ha høy luftfuktighet. I naturen er omtrent 60 % oppgitt som ideelt, og 60-80 % er et fornuftig mål i terrariet, der fuktigheten stiger etter en spraying om kvelden og faller i løpet av dagen.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og gjemmer seg i mørke sprekker om dagen, så UVB er ikke nødvendig når fôret får kalk og D3-vitamin.

FÔRING

I naturen er arten en lurejeger med et svært bredt kosthold. Mageinnhold fra ville dyr viser gresshopper, kakerlakker, biller, sommerfugler, edderkopper og skorpioner, og den tar i sjeldne tilfeller også små amfibier og øgler.

ATFERD OG HÅNDTERING

Dyret er langsomt og rolig når det ikke er truet, men kan være kvikt og aggressivt når det blir forstyrret. Det kan bite hardt, og halen kaster det av ved selv lite press.

NATURLIG UTBREDELSE

Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasil, Trinidad og Tobago, Aruba, Curaçao, Karibisk Nederland, Antigua og Barbuda, St. Lucia og Grenada.