herpy

GEKKOER

Tropiocolotes nattereri

En av verdens minste gekkoer, bare 4-6 cm med hale, fra kystene ved Aqababukta på Sinai og i det sørligste Israel og Jordan. Den er nattaktiv og lever på steinete grunn. Det finnes bare lite kunnskap om stellet, men den stelles som slektens bedre kjente arter i et terrarium på minst 20 × 20 × 20 cm.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Natterer's gecko Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-6 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Ørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**20 × 20 × 20 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Varmeplass	**35-45 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene, parvis, én hann med flere hunner eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**60-90 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tropiocolotes nattereri*.
TEMPERATUR	Hold 26-30 °C om dagen og en liten varmeflekk på 35-45 °C i den ene enden, målt på en flat stein under lampen.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luften skal være tørr, omtrent 30-50 % og ikke over 60 %. Sprøyt en del av terrariet to-tre ganger i uken om kvelden eller tidlig om morgenen: dyrene slikker dråpene av steiner og skjul, slik de slikker dugg i naturen.
LYS OG UVB	*Tropiocolotes nattereri* er nattaktiv, men slektens arter bruker gjerne varmeflekken, og en fast døgnrytme er viktig.
FÔRING	*Tropiocolotes nattereri* lever av svært små leddyr. Fôringen følger slektens bedre kjente arter: grunnfôret er mikrosirisser og vingeløse bananfluer, og som variasjon kan du gi bladlus, spretthaler og små kakerlakknymfer.
ATFERD OG HÅNDTERING	Atferden hos *Tropiocolotes nattereri* i fangenskap er ikke beskrevet. Slektens holdte arter er små, men svært aktive, jakter ivrig om kvelden og er fredelige mot hverandre.
NATURLIG UTBREDELSE	Egypt, Israel, Jordan og Saudi-Arabia.