herpy

KAMELEONER

Brookesia stumpffi

Brookesia stumpffi er en liten, bladlignende kameleon fra skogbunnen i det nordlige og nordvestlige Madagaskar. Den blir opptil omtrent 9 cm, har en rekke torner langs hver side av ryggen og skifter bare litt farge. Den legger 2-5 egg og kan holdes i par. Den krever høy luftfuktighet, et tykt løvlag og svært små fôrdyr til ungene.

Familie: Chamaeleonidae Engelsk: Plated Leaf Chameleon Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-9 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**3-4 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**5 mnd.**
Kullstørrelse	**2-5 egg**
Inkubasjon	**45-70 dager** ved 18-23 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par trenger et terrarium på minst 40 × 30 × 40 cm (lengde × bredde × høyde). Målet er et anslag ut fra dyrets størrelse, og større er en fordel, særlig hvis det er flere hunner.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 22-25 °C, og om natten er 18-20 °C passende. Det tilsvarer klimaet i løvlaget i utbredelsesområdet. Arten trenger ingen varm solplass, og en svak varmekilde i den ene enden er nok.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være 70-100 %, slik at den holder seg høy i løvlaget hele døgnet. Sprøyt terrariet 1-2 ganger om dagen, slik at løv og planter er fuktige, men slik at overflatene er tørre igjen før det sprøytes neste gang.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv. Et svakt UVB-lys tilsvarende Ferguson-sone 1 er nok, og dyret må alltid kunne trekke seg inn i skygge. Sonen er et anslag ut fra levemåten på skogbunnen; hvor mye UVB arten trenger, er ikke dokumentert.

FÔRING

Brookesia stumpffi spiser små insekter som siklader, bananfluer, kakerlakker, voksmøll og små gresshopper. Fôrdyrene må være små, og ungene fôres med spretthaler, bananfluer og nyklekte siklader.

ATFERD OG HÅNDTERING

B. stumpffi er rolig og dagaktiv og går langsomt rundt i løvet. Når den er truet, lar den seg falle og ligger stille som et dødt blad. Det er en naturlig forsvarsatferd og ikke tegn på sykdom.

NATURLIG UTBREDELSE

Madagaskar.