herpy

KAMELEONER

Brookesia superciliaris

Brookesia superciliaris er en av de største bladkameleonene og blir 9-10 cm til sammen. Den lever i løvlaget i Madagaskars østlige regnskoger, er brun som et dødt blad og har store beinknuter over øynene. Arten holdes i et lite, fuktig terrarium med et dypt løvlag og små fôrdyr. Den har rykte for å være vanskelig, men oppdrettes i dag regelmessig i små antall.

Familie: Chamaeleonidae Engelsk: Brown Leaf Chameleon Tidligere navn: *Chamaeleo superciliaris* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**9-10 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**2-4 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**70-95 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**4-5 mnd.**
Kullstørrelse	**2-5 egg**
Kull per år	**2-3**
Inkubasjon	**45-120 dager** ved 18-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes lite samlet kunnskap om stellet av *Brookesia superciliaris*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 20-25 °C og nattemperaturen 16-20 °C, som i regnskogen i høylandet. Fallet om natten kommer av seg selv når lampene slås av.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 70-95 %, høyest like etter sprøyting og om natten. Sprøyt terrariet grundig minst to ganger om dagen med lunkent vann. Dyrene drikker dråper fra bladene og bruker ikke en skål.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og lever i skygge.
FÔRING	Arten spiser små insekter: bananfluer, spretthaler, små siklader, bønnebiller og små kakerlakker. Byttet må høyst være omtrent 20 % av dyrets kroppslengde.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten holdes enkeltvis. Den er sky, men livlig og blir lett stresset av forstyrrelse og berøring, så den skal ikke tas i hånden. Ved fare kan den vibrere. Tett vegetasjon og et dypt løvlag med skjul reduserer stress.
NATURLIG UTBREDELSE	Madagaskar.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/kamaeleoner/brookesia-superciliaris