herpy

KAMELEONER

Furcifer lateralis

Furcifer lateralis er en liten, fargerik kameleon fra Madagaskars skoger, kratt og hager. Hunnen er særlig sterkt tegnet, især når hun er drektig. Arten blir bare 17-25 cm, modnes på få måneder og lever bare 2-3 år, og den beskjedne størrelsen gjør den til en overkommelig kameleon for den erfarne holderen.

Familie: Chamaeleonidae Engelsk: Carpet Chameleon Tidligere navn: *Chamaeleo lateralis; Chamaeleo lambertoni* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**17-25 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**2-3 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**3-6 mnd.**
Kullstørrelse	**6-23 egg**
Kull per år	**3-6**
Inkubasjon	**150-400 dager** ved 20-25 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr trenger et terrarium på minst 45 × 45 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Arten er liten og klarer seg i et mindre terrarium enn de store kameleonene, men høyden er viktig, fordi den bruker buskene fra bunn til topp.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal være 24-29 °C. Bruk en solplass på 32-35 °C, målt som overflatetemperatur med et IR-termometer, og la den øverste delen av terrariet ligge på 27-29 °C og skyggede steder og bunnen på 21-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være 60-100 %. Terrariet kan gjerne tørke ut i løpet av dagen, så lenge lufta er relativt fuktig og dyret kan drikke daglig.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og solelskende, så den krever kraftig lys og UVB. Bruk et T5 HO-rør med 6500 K til lys og et UVB-rør som gir Ferguson-sone 3 på solplassen.

FÔRING

F. lateralis er ren insektetende. Byttet skal være omtrent så langt som avstanden mellom øynene; melormer kan gjerne være lengre. Varier føden: sirisser, melormer, superormer, kakerlakker, bananfluer og bønnebiller.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten holdes enkeltvis. Hannene er aggressive og territoriale, og hunnene stresser lett. Dyrene kan bite hverandre, så paringen må overvåkes, og dyrene skilles når paringen er over.

NATURLIG UTBREDELSE

Madagaskar.