herpy

KAMELEONER

Trioceros hoehnelii

Trioceros hoehnelii er en liten, levendefødende kameleon fra de kjølige høylandene i Kenya og Uganda, der nettene kan nærme seg frysepunktet. Hannen har en høy hjelm og ett horn på snuten. Arten er robust mot kulde, men tåler varme dårlig, så den krever et kjølig terrarium med et tydelig temperaturfall om natten og høy nattefuktighet.

Familie: Chamaeleonidae Engelsk: Von Hoehnel's Chameleon Tidligere navn: *Chamaeleo hoehnelii; Chamaeleo bergeri; Chamaeleo leikipiensis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-25 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**15-70 g**
Levealder	**5-6 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-22 °C**
Varmeplass	**24-25 °C**
Temperatur, natt	**8-14 °C**
Luftfuktighet	**50-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**12 mnd.**
Kullstørrelse	**4-22 unger**
Kull per år	**1-2**
Drektighet	**120-180 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr trenger et terrarium på minst 60 × 45 × 90 cm (lengde × bredde × høyde). Målet er lånt fra lignende små fjellkameleoner i slekten *Trioceros* og er et minimum. Større er bedre, og høyden brukes mer enn bunnen.

TEMPERATUR

Arten kommer fra kjølig høyland og tåler varme dårlig. Dagtemperaturen i terrariet skal være 20-22 °C, og solplassen må ikke være varmere enn 24-25 °C. Unge dyr kan dø hvis temperaturen kommer høyere opp.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Natten er artens fuktige tid. Luftfuktigheten skal stige mot 100 % om natten, med tåke fra en ultralydforstøver i omtrent tre timer sent på natten og tidlig om morgenen.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og bruker mye lys. Gi 12 timers lys om dagen hele året. Et T5 HO-rør med 6500 K eller en kraftig LED-lampe over terrariets bredde gir det vanlige lyset. UVB er nødvendig.

FÔRING

T. hoehnelii er insektetende og tar de fleste insekter av passende størrelse. Gi sirisser, små gresshopper, fluer, kakerlakknymfer og andre småinsekter, og hold byttet til høyst avstanden mellom dyrets øyne.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten holdes enkeltvis. Hannene er svært aggressive mot hverandre og mot lignende arter: de hveser, pumper seg opp og blir svarte, så hanner må ikke kunne se hverandre.

NATURLIG UTBREDELSE

Kenya og Uganda.