herpy

KAMELEONER

Jacksons kameleon

Trioceros jacksonii

Trioceros jacksonii er en middels stor kameleon fra fjellskogene i Kenya og Tanzania. Hannen har tre fremoverrettede horn, og hunnen føder levende unger i stedet for å legge egg. Arten krever kjølige netter, høy nattefuktighet og omhyggelig stell, så den er mest for den erfarne holderen.

Familie: Chamaeleonidae Engelsk: Jackson's Chameleon Tidligere navn: *Chamaeleo jacksonii; Chamaeleon jacksonii* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-38 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-9 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Varmeplass	**27-30 °C**
Temperatur, natt	**10-15 °C**
Luftfuktighet	**40-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**5-12 mnd.**
Kullstørrelse	**8-30 unger**
Drektighet	**150-180 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr trenger et terrarium på minst 60 × 60 × 120 cm (lengde × bredde × høyde). Det er mer enn det absolutte minimumet på 45 × 45 × 90 cm, men et bedre mål for et dyr som skal bo der hele livet.

TEMPERATUR

Arten er et høylandsdyr og tåler varme dårlig. Dagtemperaturen i terrariet skal være 20-24 °C. På solplassen under lampen skal det være 27-30 °C. Tegn på varmestress ses allerede når hele terrariet kommer over 27 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal følge artens døgnrytme: omtrent 90-100 % om natten og 40-50 % om dagen. Konstant 60-80 % er ikke riktig og kan gjøre dyret sykt. Alle overflater skal være tørre i løpet av dagen.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og krever mye lys. Et T5 HO-rør med 6500 K eller en kraftig LED-lampe over hele terrariets bredde gir lyset. Dagslengden er 12 timer hele året, for Kenya ligger nær ekvator. UVB er nødvendig.

FÔRING

T. jacksonii er insektetende. Byttet må høyst være like stort som avstanden mellom øynene. Varier fôret: gresshopper, sirisser, kakerlakknymfer, fluer og små biller.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten holdes enkeltvis hele livet. Hanner er territoriale og bør aldri kunne se hverandre. To dyr samles bare når en hunn flyttes til en hann for paring.

NATURLIG UTBREDELSE

Kenya og Tanzania.