herpy

KAMELEONER

Trioceros melleri

Trioceros melleri er den største kameleonen på det afrikanske fastlandet. Den blir opptil 60 cm lang, har ett lite horn på snuten og lever i buskrike savanner og lyse skoger i Tanzania, Malawi og Mosambik. Arten krever svært mye plass, rikelig med vann og kjølige, fuktige netter, og hører bare hjemme hos en erfaren holder.

Familie: Chamaeleonidae Engelsk: Meller's Chameleon Tidligere navn: *Chamaeleo melleri; Ensirostris melleri* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-60 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**300-500 g**
Levealder	**5-14 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**120 × 90 × 150 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Varmeplass	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**40-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**15-80 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**180-270 dager** ved 24-26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr trenger et terrarium på minst 120 × 90 × 150 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre. Arten blir stor og tung, og et helt rom eller en stor voliere er ikke for mye.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen i terrariet skal være 22-28 °C, og på solplassen under lampen 29-32 °C. Oppgavene for dagen varierer fra 22-25 til 27-29 °C; den varme enden passer best for dyr fra kysten av Tanzania.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal følge døgnet: 40-50 % om dagen og over 90 % om natten. Konstant fukt gir luftveisinfeksjoner og sopp, så alle overflater må tørke opp i løpet av dagen. Sørg for luftbevegelse når fuktigheten er høy.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og trenger kraftig lys 12 timer i døgnet. Bruk et T5 HO-UVB-rør i en enkeltreflektor over terrariets lengde, og suppler med fullspekter- eller plantelys, slik at plantene trives. UVB er nødvendig for kalkopptaket.

FÔRING

T. melleri er insektetere. Gi varierte, store fôrdyr: sirisser, gresshopper, kakerlakker, silkeormpupper, vandrende pinner og larver av svart soldatflue.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten holdes enkeltvis hele livet. Hanner er sterkt territoriale, og selv et par i et stort terrarium gir problemer; to dyr samles bare kortvarig til paring. Hunnen er litt mildere, men heller ikke egnet til gruppehold.

NATURLIG UTBREDELSE

Malawi, Mosambik og Tanzania.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/kamaeleoner/trioceros-melleri