herpy

KAMELEONER

Flap-necked Chameleon

Chamaeleo dilepis

Chamaeleo dilepis er en middels stor, trelevende kameleon fra savanner, buskas og lysåpen skog i store deler av Afrika sør for Sahara. Den kjennes på de to hudflikene bak på hodet og på en hvit stripe langs flanken. Arten er hardfør til å være kameleon, men nesten alle dyr i handelen er villfanget. Den trenger et høyt nettterrarium med UVB, drikker bare dråper og må bo alene.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo angusticoronatus; Chamaeleo bilobus; Chamaeleo capellii; Chamaeleo isabellinus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-35 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**3-8 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**20-75 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**300-365 dager** ved 27-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr trenger et nettterrarium på minst 60 × 45 × 90 cm (lengde × bredde × høyde). Til en stor hunn er 60 × 60 × 90 cm bedre, og større er alltid en fordel. Unger kan gå i 40 × 40 × 75 cm.

TEMPERATUR

Om dagen skal temperaturen i terrariet være 25-30 °C, og på en solgren skal det være 32-35 °C. Start med en 60 W-pære og juster etter målingen: en for sterk lampe kan gi alvorlige brannskader, selv gjennom nettet.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være omtrent 50-60 %, og etter sprøyting kan den gjerne komme opp mot 70 %, så lenge terrariet tørker igjen. Planter hjelper til med å holde fuktigheten.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og solelskende og skal ha kraftig lys i 12 timer og mørke i 12 timer. Fullspektrumlys og UVB er nødvendig, for dyret danner D3 i huden og trenger den for å ta opp kalk.

FÔRING

Arten spiser insekter: siriss, gresshopper, kakerlakker (for eksempel *Blaptica dubia*), silkeormer, hornormer, svarte soldatfluer og larvene deres, og i mindre mengder melorm og voksmøllarver, som er feite.

ATFERD OG HÅNDTERING

Chamaeleo dilepis er mild og rolig sammenlignet med mange andre kameleoner, men det er et dyr man ser på, ikke et man tar opp. Håndtering stresser og skal bare skje når det er nødvendig.

NATURLIG UTBREDELSE

Etiopia, Somalia, Sør-Sudan, Kenya, Tanzania, Mosambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Sør-Afrika, Eswatini, Lesotho, Angola, Kongo, Kongo-Brazzaville, Gabon, Ekvatorial-Guinea, Kamerun, Nigeria, Togo, Burundi og Rwanda.