herpy

KAMELEONER

Spectral Pygmy Chameleon

Rhampholeon spectrum

Rhampholeon spectrum er en liten, bladlignende kameleon på 7-10 cm fra skogbunnen i Vest- og Sentral-Afrika. Den er grønnbrun til grå som et dødt blad, med to skrå, mørke striper på sidene og en liten, myk hudflik på snuten. Den holdes i et lite, fuktig og tett beplantet terrarium med et tykt løvlag. Stellet er bare lite kjent, så tallene bygger på nære slektninger.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Brookesia spectrum; Chamaeleo spectrum; Rhampholeon affinis*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-10 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**2-4 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**70-95 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**3-9 mnd.**
Kullstørrelse	**2-5 egg**
Inkubasjon	**150-210 dager** ved 18-23 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Rhampholeon spectrum*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 20-25 °C og nattemperaturen 16-20 °C. Fallet om natten kommer av seg selv når lampene slås av.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 70-95 % om dagen og 80-95 % om natten. Sprut terrariet grundig minst to ganger om dagen, om morgenen og igjen om kvelden, med lunkent vann.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og lever i skygge, så lyset skal ligne skogens dempede lys.
FÔRING	Arten spiser små insekter og andre leddyr: bananfluer, små sirisser, bønnebiller, kornsnutebiller, små kakerlakker og spretthaler til de yngste. Byttet kan høyst være omtrent 20 % av dyrets kroppslengde.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten holdes enkeltvis. Aggresjonen mellom artsfrender er lav, men to dyr sammen stresser lett det underlegne dyret, så de samles bare til parring.
NATURLIG UTBREDELSE	Kamerun, Kongo-Brazzaville, Ekvatorial-Guinea, Den sentralafrikanske republikk, Gabon og Nigeria.