herpy

KAMELEONER

Short-Tailed Pygmy Chameleon

Rieppeleon brevicaudatus

Rieppeleon brevicaudatus er en liten, brun og bakkelevende kameleon fra skogbunnen i Tanzania og Kenya. Den blir bare 8-10 cm, legger egg og ligner et dødt blad. Arten er robust til sin størrelse og holdes i et lite, fuktig terrarium med et tykt løvlag og høyst 25 °C om dagen.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Rhampholeon brevicaudatus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**3-5 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**70-95 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**4-8 mnd.**
Kullstørrelse	**1-6 egg**
Kull per år	**2-4**
Inkubasjon	**60-75 dager** ved 20-25 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr skal ha et terrarium på minst 40 × 30 × 40 cm (lengde × bredde × høyde). Et par eller en hann med to hunner skal ha minst 75 × 30 × 40 cm.

TEMPERATUR

Arten kommer fra skogbunnen og tåler varme dårlig. Dagtemperaturen skal være 20-25 °C og nattemperaturen 16-20 °C. Kortvarig tåler den mer, men over 30 °C er farlig.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være 70-95 %; arten tåler kortvarig ned til omtrent 60 %.

LYS OG UVB

Arten lever i skogbunnen og trenger ikke kraftig lys. Et lysstoffrør eller en LED med hvitt lys i hele terrariets lengde, på omtrent 12 timer om dagen, passer til dagslengden i Øst-Afrika.

FÔRING

Rieppeleon brevicaudatus spiser små insekter og andre leddyr: bananfluer, små siriss, kakerlakknymfer og skrukketroll. Byttet må ikke være større enn avstanden mellom dyrets øyne.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten holdes enkeltvis, i par eller som en hann med to hunner i et stort nok terrarium. Hanner må ikke holdes sammen, og hunner kan stresse hverandre i små terrarier, særlig hvis de er av forskjellig størrelse.

NATURLIG UTBREDELSE

Tanzania og Kenya.