herpy

KAMELEONER

Usambara Three-Horned Chameleon

Trioceros deremensis

Trioceros deremensis er en stor, kraftig bygd kameleon fra fjellskogene i det østlige Tanzania. Hannen har tre lange, ringede horn, mens hunnen helt mangler dem. Arten er rolig mot sin holder, men krever kjølige temperaturer og svært høy luftfuktighet, og avlen er krevende, så den er bare for svært erfarne holdere.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo deremensis*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**120-150 g**
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**9-12 mnd.**
Kullstørrelse	**8-60 egg**
Inkubasjon	**110-130 dager** ved 22 °C

STELL

Min. terrarium	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et voksent dyr trenger et nett-terrarium på minst 60 × 60 × 120 cm (lengde × bredde × høyde). Målet er et anslag: det er satt litt større enn for *Trioceros quadricornis*, fordi *T. deremensis* er større og tyngre.

TEMPERATUR
Arten er en fjellart og foretrekker moderate til kjølige temperaturer. Dagtemperaturen skal være 20-24 °C og nattemperaturen 18-20 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal være minst 80 % og gjerne høyere. Arten klarer seg best med en ultralydforstøver rettet rett mot terrariet og en jevn strøm av dryppende vann, helst rett over dyret.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og må ha rikelig med lys. Bruk UVB-lysstoffrør og en svak varmelampe. UVB-sonen er ikke målt for arten. Sone 2 er lånt fra *Trioceros jacksonii*, som også er en fjellkameleon fra Øst-Afrika og regnes til sone 2-3.

FÔRING
Trioceros deremensis er insektetende og har som regel stor appetitt. Gi variert fôr som sirisser, fluer, gresshopper og andre fôrinsekter av passende størrelse.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten holdes enkeltvis og er rolig mot sin holder, men aggressiv mot artsfrender. Den er stillesittende, velger gjerne ett sted der den sitter lenge, og flytter seg mest for å sole seg eller spise.

NATURLIG UTBREDELSE
Tanzania.