herpy

KAMELEONER

Four-horned Chameleon

Trioceros quadricornis

Trioceros quadricornis er en middels stor kameleon fra de kjølige fjellskogene i Kamerun og det sørøstlige Nigeria. Hannen har flere horn på snuten og en høy seilkam på ryggen. Arten er sky, tåler varme og tørrhet dårlig, og mange dyr i handelen er viltfangede, så den er for den erfarne holderen.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo quadricornis; Chamaeleo eisentrauti; Trioceros eisentrauti*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-37 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**3-7 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, natt	**13-18 °C**
Luftfuktighet	**50-100 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**6 mnd.**
Kullstørrelse	**8-15 egg**
Kull per år	**2-4**
Inkubasjon	**120-150 dager** ved 20-23 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et voksent dyr trenger et nett-terrarium på minst 60 × 60 × 90 cm (lengde × bredde × høyde), og gjerne opptil 120 cm høyt. Større er alltid bedre.
TEMPERATUR	Arten er en kjøligkrevende fjellart. Dagtemperaturen skal være 20-25 °C, og 22-25 °C er ideelt. Om natten skal temperaturen falle omtrent 5 °C til 13-18 °C, og den må ikke holdes oppe med lamper eller varmematter.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være minst 50 % og helst 70 % eller mer om dagen og stige mot 100 % om natten. Er fuktigheten vedvarende lav, tørker dyret ut og får nyre- og luftveissykdommer.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv. UVB-lysstoffrør er det beste hovedlyset, og en liten glødepære er nok som solplass. Naturlig sollys uten glass er en stor fordel, for vanlig vindusglass filtrerer bort UVB.
FÔRING	*Trioceros quadricornis* er insektetende. Gi så variert fôr som mulig: små møll, fluer, snegler, skrukketroll, sirisser og superorm. Møll, fluer og snegler blir sjelden avvist. Fettrike voksormlarver gis bare sparsomt.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten holdes enkeltvis. Samhusing gir stress, og hunner kan dø av luftveisinfeksjon eller slutte å spise. Arten er sky og trekker seg tilbake, og den håndteres så lite som mulig.
NATURLIG UTBREDELSE	Kamerun og Nigeria.