herpy

LEGUANER

Texas horned lizard

Phrynosoma cornutum

Phrynosoma cornutum er en bred, flattrykt øgle med horn på hodet og to rader med spisse skjell langs sidene. Den lever på åpent, tørt gressland og i kratt i det sørlige USA og det nordlige Mexico. Den blir 7-13 cm fra snute til kloakk, er dagaktiv og lever mest av maur. Nettopp føden er den store hindringen: den er vanskelig å erstatte, og arten er en av de vanskeligste øglene å holde i terrarium.

Familie: Phrynosomatidae Tidligere navn: *Agama cornuta; Phrynosoma brevicornis; Phrynosoma bufonium; Phrynosoma harlanii; Phrynosoma planiceps*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-13 cm** snute-kloakk-lengde
Vekt	**25-90 g**
Levealder	**7-9 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-29 °C**
Varmeplass	**38-42 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24 mnd.**
Kullstørrelse	**14-37 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**40-61 dager** ved 27-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell og pleie av *Phrynosoma cornutum*. Stell og pleie bygger derfor på leveområdet: åpent, tørt terreng, løs jord, sterk sol og en føde av maur.

TEMPERATUR

Arten er en solelsker og trenger en solplass der overflaten når 38-42 °C, målt med et infrarødt termometer. Resten av terrariet skal være kjøligere, 27-29 °C om dagen, slik at øglen selv kan velge hvor lenge den vil ligge i varmen.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være lav, 20-40 %, og terrariet skal tørke helt opp i løpet av dagen. Bunnen må ikke være våt. Arten drikker nesten ikke av en skål, men slikker dugg og regndråper av planter og av sin egen kropp.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og tilbringer dagen i åpent sollys, så den trenger kraftig lys og UVB hele året. Bruk et UVB-rør (Ferguson-sone 3, T5 HO 10-14 %) eller en kombinert UVB-metalldamplampe over solplassen.

FÔRING

Føden er den avgjørende begrensningen. I naturen er omtrent 70 % av føden høstmaur (*Pogonomyrmex*), og ungene spiser bare små maur. Resten er termitter, biller og gresshopper. Denne kosten kan ikke gjentas fullt ut i et terrarium.

ATFERD OG HÅNDTERING

Phrynosoma cornutum er rolig og stille og lever alene. Den gjør ikke mye av seg og er lett å overse, fordi den smelter sammen med underlaget. Den beveger seg i korte strekk, hever overkroppen og ser seg omkring.

NATURLIG UTBREDELSE

USA og Mexico.