herpy

LEGUANER

Desert Spiny Lizard

Sceloporus magister

Sceloporus magister er en robust, tornete øgle fra ørkenene i det sørvestlige USA og det nordvestlige Mexico. Den er dagaktiv, klatrer i trær, busker og på klipper og lever av insekter. Hannen har blå flekker på hals og buk. Den krever et stort, tørt terrarium med kraftig UVB, en svært varm solplass og en kjølig vinterdvale. Hunnen legger egg.

Familie: Phrynosomatidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-30 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende, klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Ørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 50 × 50 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Varmeplass	**38-42 °C**
Temperatur, natt	**16-22 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**9-12 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-24 mnd.**
Kullstørrelse	**4-24 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**60-80 dager** ved 27-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite spesifikk kunnskap om stellet av *Sceloporus magister*, og den bygger på ørkenklimaet og på kunnskap om slekten.
TEMPERATUR	Luften skal være 27-32 °C om dagen. Solplassen skal ha 38-42 °C på overflaten, målt med et infrarødt termometer. Arten foretrekker en kroppstemperatur omkring 33 °C, og solplassen må være varm nok til at den raskt kan nå den.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være lav, omtrent 20-40 %. Terrariet må være tørt og godt ventilert. Sett fram en lav skål med friskt vann, og skift vannet daglig. Sprøyt av og til terrariets side lett, slik at dyret kan slikke dråper.
LYS OG UVB	*Sceloporus magister* er dagaktiv og soler seg, så den må ha kraftig UVB. Bruk et T5 HO-rør (Ferguson-sone 3) i en reflektor over solplassen.
FÔRING	Arten er insektetende. Gi varierte levende insekter: sirisser, kakerlakker, gresshopper, melorm, Zophobas, silkeormer og voksmøllarver. Fôrdyrene må ikke være større enn dyrets hode.
ATFERD OG HÅNDTERING	Dyret er oppmerksomt, raskt og territorielt, og håndtering stresser det. Hold håndtering på et minimum, og ta aldri tak i halen, for den kan brekke av.
NATURLIG UTBREDELSE	USA og Mexico.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/leguaner/sceloporus-magister