herpy

LEGUANER

Western fence lizard

Sceloporus occidentalis

Sceloporus occidentalis er en liten, rask og grovskjellet øgle fra det vestlige USA som sitter på steiner, stammer og gjerder i full sol. Hannen har blå flekker på buken og strupen, som han viser frem med armhevinger. Arten blir omtrent 21 cm, er dagaktiv og lever av insekter. Den krever en kraftig solplass, UVB, et romslig terrarium og et tettsluttende lokk.

Familie: Phrynosomatidae Tidligere navn: *Sceloporus longipes; Sceloporus smaragdinus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**14-23 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**4-5 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende, klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Klippeterreng og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-28 °C**
Varmeplass	**38-42 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-24 mnd.**
Kullstørrelse	**3-17 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**55-65 dager** ved 27-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell og pleie av akkurat *Sceloporus occidentalis*, så stell og pleie bygger på de kravene som de små, solelskende artene i slekten deler.
TEMPERATUR	Om dagen skal temperaturen være 27-28 °C. Rett under en varmelampe skal det være en solplass på 38-42 °C, målt på overflaten med et infrarødt termometer.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være moderat, omtrent 30-50 %. Arten lever i åpne, solbelyste områder og tåler ikke vedvarende dampende fuktighet, men bunnen må heller ikke være knusktørr. Tallet er et anslag ut fra leveområdet.
LYS OG UVB	*Sceloporus occidentalis* er dagaktiv og solelskende og trenger sterkt lys og UVB hele året. Bruk et UVB-rør (Ferguson-sone 3) eller en kombinert UVB-metalldamplampe over solplassen.
FÔRING	*Sceloporus occidentalis* er insektetere. I naturen spiser den sirisser, edderkopper, flått, skorpioner, maur og biller og tar nå og da en mindre øgle.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Sceloporus occidentalis* er våken, rask og territoriell. Hannene viser seg frem med armhevinger, hodenikk og oppblåst kropp. Arten blir ikke tam og egner seg ikke for håndtering. Den stresses lett og kaster halen hvis den gripes.
NATURLIG UTBREDELSE	USA og Mexico.