herpy

PILGIFTFROSKER

Adelphobates castaneoticus

Adelphobates castaneoticus er en liten, lakkblank svart pilgiftfrosk med hvite eller gulaktige flekker og lysende oransje flekker ved forbena og knærne. Den lever på skogbunnen i delstaten Pará i det brasilianske Amazonas og er oppkalt etter paranøtten, hvis tomme skall hannen bruker som vannbasseng til rumpetrollene. Det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Brazil-nut Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates castaneoticus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-23 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**5-7 mnd.**
Egg per legging	**4-8**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og andre rumpetroll**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Adelphobates castaneoticus*. Arten lever i løvlaget på skogbunnen i et varmt og fuktig lavlandsklima.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal ligge på 24-27 °C, og om natten faller den 3-4 °C, til 20-24 °C. Svingningen over året skal være liten, 1-2 °C. Det passer med lavlandsklimaet i Pará. Det skal ikke være noe solpunkt og ingen varmelampe.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være omtrent 70-80 % midt på dagen og tett på 100 % morgen og kveld, og løvlaget og substratet skal være fuktig hele tiden.

VANN OG VANNKVALITET

En vannskål er ikke nødvendig med mindre man vil ha yngel. Froskene får fuktigheten fra sprøyting og det fuktige løvet.

LYS OG UVB

Gi 10-12 timers lys om dagen med lysstoffrør eller LED til plantene. I naturen lever arten i skyggen under skogens kroner, så lyset skal gi plantene nok til å gro uten å varme opp terrariet.

FÔRING

A. castaneoticus lever i naturen av maur, termitter og andre små leddyr. I fangenskap fôres den med spretthaler, små bananfluer og små skrukketroll.

ATFERD OG HÅNDTERING

A. castaneoticus er dagaktiv og lever mest på skogbunnen. Temperament og territorieatferd er ikke dokumentert, men *A. galactonotus* kan bli aggressiv mot artsfrender når den blir kjønnsmoden.

NATURLIG UTBREDELSE

Brasil.