herpy

PILGIFTFROSKER

Adelphobates quinquevittatus

Adelphobates quinquevittatus er en veldig liten, lakkblank svart pilgiftfrosk på 14-16 mm med hvite striper og grå, grønnaktige eller oransje ben. Den lever i løvlaget i regnskogen i Madeira-elvas nedbørfelt i det sørlige Amazonas og holdes bare sjelden. Det finnes svært lite kunnskap om stellet.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Rio Madeira Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates quinquevittatus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**14-16 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**4-8**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og andre rumpetroll**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes svært lite kunnskap om stellet av *Adelphobates quinquevittatus*. Arten lever i løvlaget i et varmt og fuktig lavlandsklima.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen skal ligge på 24-27 °C, og om natten faller den 3-4 °C, til 20-24 °C. Svingningen over året skal være liten, 1-2 °C. Det passer med lavlandsklimaet i Rondônia. Det skal ikke være noe solpunkt og ingen varmelampe.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være omtrent 70-80 % midt på dagen og tett på 100 % morgen og kveld, og løvlaget og substratet skal være fuktig hele tiden.

VANN OG VANNKVALITET
En vannskål er ikke nødvendig med mindre man vil ha yngel. Froskene får fuktigheten fra sprøyting og det fuktige løvet.

LYS OG UVB
Gi 10-12 timers lys om dagen med lysstoffrør eller LED til plantene. I naturen lever arten i skyggen under skogens kroner, så lyset skal gi plantene nok til å gro uten å varme opp terrariet.

FÔRING
A. quinquevittatus lever i naturen mest av maur og termitter. I fangenskap fôres den med små bananfluer (*Drosophila melanogaster*), spretthaler, mikrosirisser, små voksmøllarver, siktet engplankton og små skrukketroll.

ATFERD OG HÅNDTERING
A. quinquevittatus er dagaktiv og lever mest i løvlaget. Temperament og territorieatferd er ikke dokumentert.

NATURLIG UTBREDELSE
Brasil.