herpy

PILGIFTFROSKER

Allobates femoralis

Allobates femoralis er en liten, mørk frosk på 3-4 cm fra Amazonas og Guyanaskjoldet med en oransjegul flekk bak armen og en halvmåneformet oransje flekk på låret. Den er dagaktiv og lever på bakken, hannene forsvarer territorier med et høyt rop, og frieriet er et av de lengste blant pilgiftfroskene. Arten tilhører familien Aromobatidae og regnes som ugiftig.

Familie: Aromobatidae Engelsk: Brilliant-thighed Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates femoralis; Phyllobates femoralis; Dendrobates femoralis* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**8-20**
Klekking	**15-20 dager**
Larvetid	**40-50 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par *Allobates femoralis* kan holdes i et glassterrarium på 60 × 40 × 40 cm, og minst 50 × 50 × 50 cm nevnes også. Arten lever på bakken, så gulvarealet teller mest, men hannene klatrer gjerne litt opp for å rope.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal ligge på 25-28 °C, og om natten senkes den 3-4 grader. Et døgnforløp fra omtrent 21 °C om natten til 28 °C om dagen tilsvarer forholdene i Fransk Guyana og har gitt gode resultater med avl.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være høy: 70-80 % midt på dagen og opp mot 100 % morgen og kveld.

VANN OG VANNKVALITET

Gi en lav glassskål på omtrent 10 cm i diameter med 1-2 cm vann, som froskene lett kommer seg opp av. Den brukes også av hannen når han skal bli kvitt rumpetrollene.

LYS OG UVB

Lyset er først og fremst til plantene. 12 timers lys om dagen, for eksempel fra kl. 7 til 19, har fungert godt, og lysstoffrør eller LED på omtrent 6.500 K gir naturlige farger og god plantevekst.

FÔRING

Allobates femoralis lever av små insekter. I terrariet består grunnfôret av vingeløse bananfluer, supplert med spretthaler, helt små sirisser, små voksmøllarver og engplankton. Ungene tar mest spretthaler og små bananfluer.

ATFERD OG HÅNDTERING

Allobates femoralis er dagaktiv, og hannene er territorielle.

NATURLIG UTBREDELSE

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Peru og Surinam.