herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega bassleri

Ameerega bassleri er en dagaktiv pilgiftfrosk på knapt 4 cm fra de fuktige skogene ved foten av Andes i det nordlige Peru. Hannen passer eggene og bærer rumpetrollene til vannet, og arten må holdes kjøligere enn de fleste pilgiftfroskene. Det finnes bare lite kunnskap om stellet, og arten er sårbar i naturen.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Pleasing Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates bassleri; Dendrobates bassleri; Phobobates bassleri* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Kjønnsmoden	**12-13 mnd.**
Egg per legging	**40**
Klekking	**10 dager**
Larvetid	**50-60 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**50 × 50 × 55 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-21 °C**
Temperatur, natt	**13-17 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Ameerega bassleri*. Arten lever i fuktig skog ved bekker i 300-1200 m høyde, der luften er kjøligere enn hos de fleste pilgiftfroskene.

TEMPERATUR
Arten må ikke holdes for varmt. Om dagen passer 18-21 °C, og om natten skal temperaturen falle 4-6 °C, til omtrent 13-17 °C. Forskjellen mellom årstidene er bare 1-2 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 70-100 %. Morgen og kveld er den tett på 100 % med tåke, mens den midt på dagen kan falle til omtrent 70 %.

VANN OG VANNKVALITET
En vannskål med 1-2 cm vann skal være i terrariet, og et fast vannparti eller små beholdere brukes til rumpetrollene ved yngel. Bruk regnvann eller osmosevann og bytt vannet flere ganger i uken.

LYS OG UVB
Arten lever på skogbunnen, der bare lite lys når ned. LED-lys med plantevennlig spektrum og 10-12 timers dagslengde er nok.

FÔRING
Arten tar de vanlige små fôrdyrene: bananfluer, spretthaler, nyklekte sirisser, de minste voksmøllarvene og håvede småinsekter fra engen. Fôr annenhver dag med så mye som dyrene spiser på omtrent en time.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten er dagaktiv og lever på bakken. Hannen er territoriell og roper for å forsvare området sitt, så dyrene må ha mange gjemmesteder og avbrutte synslinjer. Et par kan holdes sammen; flere hanner i samme terrarium gir strid.

NATURLIG UTBREDELSE
Peru.