herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega bilinguis

Ameerega bilinguis er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 17-23 mm fra løvlaget i regnskogen i det nordvestlige Amazonas-lavlandet. Ryggen er svart med røde knotter, og undersiden er lyseblå med svarte tegninger. Arten holdes sjelden, og det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Ecuador Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates bilinguis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**17-23 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-26 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**4-16**
Klekking	**10-22 dager**
Larvetid	**70-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Ameerega bilinguis*, men arten holdes i små antall, og grunntallene for terrariet er kjent. Den stelles som andre små *Ameerega*-arter fra løvlaget i regnskogen.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 25-26 °C, og om natten senkes den 4-5 grader til 20-22 °C. Arten er knyttet til skogbunnens jevne klima og tåler varme dårlig; temperaturer over 28 °C er en risiko, særlig hvis luften samtidig står stille.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten er 70-80 % om dagen, med et dykk til omtrent 70 % midt på dagen, og tett på 100 % morgen og kveld, gjerne med tåke.

VANN OG VANNKVALITET

En flat vannskål med 1-2 cm vann gir froskene mulighet til å drikke og er nødvendig hvis det skal yngles, for hannen setter rumpetrollene av der. Skålen må ha en skråning eller stein, slik at en frosk kan komme opp igjen.

LYS OG UVB

Lyset skal først og fremst gi plantene en dag-natt-rytme på omtrent 12 timer, og her er en LED-lampe til planter nok. UVB er ikke nødvendig for pilgiftfrosker, så det er valgfritt.

FÔRING

Fôret er små, levende leddyr: spretthaler og bananfluer (*Drosophila melanogaster*), mikrosirisser, siktet engplankton og små tanglopper. Frosken er liten, så større fôrdyr som *Drosophila hydei* passer bare til de voksne.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er dagaktiv og lever mest på bakken, men hannene klatrer gjerne opp på litt hevede plasser for å rope. Den kan holdes i par eller i en gruppe hvis terrariet er stort nok til at hannene kan holde avstand.

NATURLIG UTBREDELSE

Colombia, Ecuador og Peru.