herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega cainarachi

Ameerega cainarachi er en rødrygget pilgiftfrosk på omtrent 3 cm som bare er kjent fra fjellfoten rundt Tarapoto i det nordlige Peru. Arten er truet i naturen, og det finnes bare lite kunnskap om stellet, så veiledningen bygger på klimaet, leveområdet og de nære slektningene *Ameerega bassleri* og *Ameerega pepperi*.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Cainarachi Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**12-13 mnd.**
Egg per legging	**22-44**
Klekking	**10 dager**
Larvetid	**50-60 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Ameerega cainarachi*. Arten lever i samme område som *Ameerega bassleri* og *Ameerega pepperi*, og avlstallene er lånt fra dem (se Avl).

TEMPERATUR
Om dagen passer 22-26 °C, og om natten skal temperaturen falle opptil 5 °C, til omtrent 19-22 °C. Forskjellen mellom årstidene er bare 1-2 °C. Det er ingen vinterdvale.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 70-100 %: omtrent 70 % midt på dagen og tett på 100 % med tåke morgen og kveld. Sprøyt eller bruk regnanlegg og forstøver et par ganger om dagen.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål med 1-2 cm vann er nok, og den skal være lett å komme inn og ut av. Bruk regnvann, osmosevann eller avklort springvann, og bytt vannet annenhver dag, slik at det ikke samler seg bakterier.

LYS OG UVB
Lyset skal først og fremst dekke plantenes behov: LED-lys til plantevekst i 10-12 timer om dagen med en tydelig natt. Behovet for UVB er ikke dokumentert; en svak UVB-lampe (Ferguson-sone 1) er valgfri.

FÔRING
Froskene tar de vanlige små fôrdyrene: bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *Drosophila hydei*), spretthaler, små tanglopper, nyklekte sirisser, de minste voksmøllarvene og håvede småinsekter fra engen.

ATFERD OG HÅNDTERING
Ameerega cainarachi er dagaktiv og holder til på skogbunnen. Hannene i slekten er territorielle og roper fra faste plasser.

NATURLIG UTBREDELSE
Peru.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/pilegiftfroer/ameerega-cainarachi