herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega macero

Ameerega macero er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 24-30 mm fra regnskogene rundt Manu i det sørøstlige Peru og det vestlige Brasil. Hode og rygg er klart røde, flankene svarte med en gul stripe, og buken er blå med svart nettmønster. Arten holdes sjelden, og det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Manu Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates macero* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**21-25 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**4-16**
Klekking	**10-22 dager**
Larvetid	**70-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Ameerega macero*. Arten holdes som den like store *Ameerega petersi*, som den lenge har blitt forvekslet med, og tallene for terrarium og klima er lånt derfra.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 25-28 °C, og om natten senkes den 3-4 grader til 21-25 °C. Dyr fra de høyere delene av utbredelsesområdet tåler kjøligere netter, og den lave enden av intervallet passer best. Vinterhvile er ikke nødvendig.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %: nær 100 % morgen og kveld, gjerne med tåke, og rundt 70-80 % midt på dagen. Sprøyt med osmose- eller regnvann morgen og kveld, eller bruk et tåke- eller regnanlegg på timer.

VANN OG VANNKVALITET

En lav vannskål med 1-2 cm vann er nok. Skålen må være så lav at en unge kan komme opp av den, og ha steiner eller mose i kanten. Skift vannet ofte, og rengjør skålen med varmt vann uten såpe.

LYS OG UVB

Gi en LED-lampe med plantevennlig spekter i 10-12 timer om dagen. UVB er ikke nødvendig for pilgiftfrosker; en svak UVB-lampe (Ferguson-sone 1) er valgfritt. Gi froskene skygge og skjul, slik at de kan trekke seg bort fra lyset.

FÔRING

I naturen spiser frosken maur, biller og små larver på 2-7 mm. I terrariet brukes vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *D. hydei*), spretthaler, små bænkebitere, mikrogresshopper og siktet engplankton.

ATFERD OG HÅNDTERING

Hannene roper fra bakken eller fra lave stammer og forsvarer trolig små territorier, slik slektningene gjør. I naturen kan det leve omtrent ti voksne per 1.000 m² langs en bekk.

NATURLIG UTBREDELSE

Peru og Brasil.