herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega parvula

Ameerega parvula er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 18-24 mm fra løvlaget i regnskogen i det vestlige Amazonas-lavlandet og ved foten av Andes. Ryggen er svart med mørkerøde flekker, og undersiden er blå og svart marmorert. Arten holdes sjelden, og det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Ruby Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates parvulus; Dendrobates parvulus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-24 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-26 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**4-16**
Klekking	**10-22 dager**
Larvetid	**70-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Ameerega parvula*. Arten lever i samme slags skog som den nært beslektede *Ameerega bilinguis*, som har samme størrelse, og tallene for terrarium, klima og avl er lånt derfra.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen er 25-26 °C, og om natten senkes den 4-5 grader til 20-22 °C. Arten er knyttet til skogbunnens jevne klima og tåler varme dårlig; temperaturer over 28 °C er en risiko, særlig hvis luften samtidig står stille.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten er 70-80 % om dagen, med et dykk til omtrent 70 % midt på dagen, og tett på 100 % morgen og kveld, gjerne med tåke.

VANN OG VANNKVALITET
En flat vannskål med 1-2 cm vann gir froskene mulighet til å drikke og er nødvendig hvis det skal yngles, for hannen setter rumpetrollene av der. Skålen må ha en skråning eller stein, slik at en frosk kan komme opp igjen.

LYS OG UVB
Lyset skal først og fremst gi plantene en dag-natt-rytme på omtrent 12 timer, og her er en LED-lampe til planter nok. UVB er ikke nødvendig for pilgiftfrosker, så det er valgfritt.

FÔRING
Fôret er små, levende leddyr: spretthaler og bananfluer (*Drosophila melanogaster*), mikrosirisser, siktet engplankton og små tanglopper. Frosken er liten, så større fôrdyr som *Drosophila hydei* passer bare til de voksne.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten er dagaktiv og lever mest på bakken. Hannene roper og forsvarer formodentlig små revir, slik slektningene gjør, så et par er den sikre holdformen i et mindre terrarium.

NATURLIG UTBREDELSE
Colombia, Ecuador og Peru.