herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega petersi

Ameerega petersi er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 24-30 mm fra regnskogen ved foten av Andes i det østlige Peru og det vestlige Brasil. Ryggen er brun med en lys, skrå sidestripe. Arten holdes sjelden, og det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Peru Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates petersi; Dendrobates petersi* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**4-16**
Klekking	**10-22 dager**
Larvetid	**70-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**21-25 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Ameerega petersi*, men arten holdes i små antall, og grunntallene for terrariet er kjent. Den stelles som andre små *Ameerega*-arter fra løvlaget i regnskogen.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen er 25-28 °C, og om natten senkes den 3-4 grader til 21-25 °C. Svingningen over året er bare 1-2 grader.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %: tett på 100 % morgen og kveld, gjerne med tåke, og omtrent 70-80 % midt på dagen. Sprøyt med osmose- eller regnvann morgen og kveld, eller bruk et tåke- eller regnanlegg på timer.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål på 1-2 cm vann er nok. Skålen må være så lav at en unge kan komme opp av den, og ha stein eller mose i kanten. Bytt vannet ofte, og rengjør skålen med varmt vann uten såpe.

LYS OG UVB
Gi et LED-lys med plantevennlig spektrum i 10-12 timer om dagen. UVB er ikke nødvendig for pilgiftfrosker; et svakt UVB-lys (Ferguson-sone 1) er valgfritt. Gi froskene skygge og skjul, slik at de kan trekke seg bort fra lyset.

FÔRING
Kosten består av små levende leddyr fra løvlaget. I terrariet brukes vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *D. hydei*), spretthaler, små tanglopper, mikrosirisser, siktet engplankton og de minste voksmøllarvene.

ATFERD OG HÅNDTERING
Hannene i slekten roper og forsvarer små territorier. Det er ikke beskrevet hvordan *Ameerega petersi* oppfører seg i grupper, så et par er den sikreste holdformen.

NATURLIG UTBREDELSE
Peru og Brasil.