herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega picta

Ameerega picta er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk med mørkebrun rygg, svarte sider med lyse striper og gule til røde flekker på lårene. Den lever på skogbunnen fra Amazonas-lavlandet opp i foten av Andes i Bolivia, Peru, Colombia og Brasil og har en isolert bestand i Venezuela. Arten holdes bare sjelden, så stellet bygger på klimaet i utbredelsesområdet og på nære slektninger.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Spot-legged Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates pictus; Dendrobates pictus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**22-28 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**15-40**
Klekking	**15-22 dager**
Larvetid	**40-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Ameerega picta*. Arten holdes bare sjelden, og den store høydeutbredelsen gjør det vanskelig å si hvilket klima den enkelte bestanden er tilpasset.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 21-25 °C om dagen, og la temperaturen falle 3-4 °C om natten, til 18-22 °C. Svingningen over året skal være liten, 1-2 °C. Frosker tåler varme dårlig: temperaturer over omtrent 28 °C er farlige.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 70-80 % midt på dagen og tett på 100 % morgen og kveld. Et regnanlegg eller en forstøver med timer er det enkleste; ellers sprøytes to til tre ganger om dagen med osmosevann eller regnvann.
VANN OG VANNKVALITET	Gi en lav vannskål med 1-2 cm vann, slik at froskene lett kommer opp av den, og med stein eller mose i kanten. Skålen brukes av de voksne når rumpetrollene skal settes av.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremst til plantene: 10-12 timer om dagen med LED-lys med plantevennlig spektrum. Det er ikke dokumentert at *Ameerega picta* trenger UVB.
FÔRING	Frosken lever i naturen av små leddyr. I terrariet består kosten av vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *D. hydei*), spretthaler, små tanglopper, mikrosirisser, små voksmøllarver og siktet engplankton.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Ameerega picta* er dagaktiv og lever mest på bakken. Hannene i slekten forsvarer små territorier, så et par er den sikreste holdformen. Hold ikke to hanner sammen i et lite terrarium.
NATURLIG UTBREDELSE	Bolivia, Brasil, Peru, Colombia og Venezuela.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/pilegiftfroeer/ameerega-picta