herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega rubriventris

Ameerega rubriventris er en liten, mørk pilgiftfrosk på 21-25 mm med lyse sidestriper og en rød- eller oransjesvart marmorert buk. Den lever bare i skogene ved Cordillera Azul i det sentrale Peru og er truet. Arten holdes sjelden, og det finnes bare lite kunnskap om stell og hold.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Cordillera Azul Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates rubriventris* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**21-25 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**21-25 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**4-16**
Klekking	**10-22 dager**
Larvetid	**70-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell og hold av *Ameerega rubriventris*. Klimaet i fjellskogene ved Cordillera Azul er varmt og fuktig hele året, og arten holdes som andre små *Ameerega*-arter fra regnskogens løvlag.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 25-28 °C, og om natten senkes den 3-4 grader til 21-25 °C. Temperaturen svinger bare 1-2 grader gjennom året, og en vinterdvale er ikke nødvendig.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten er 70-80 % om dagen, med et dykk til omtrent 70 % midt på dagen, og tett på 100 % morgen og kveld, gjerne med tåke.

VANN OG VANNKVALITET

En lav vannskål med 1-2 cm vann er nok, og den skal være lett å komme seg inn og ut av. Bruk regnvann, osmosevann eller avklorert springvann, og skift vannet annenhver dag, slik at det ikke samler seg bakterier.

LYS OG UVB

Lyset skal først og fremst dekke plantene: en LED-lampe for plantevekst i 10-12 timer om dagen og en tydelig natt. UVB er ikke nødvendig for pilgiftfrosker; en svak UVB-lampe (Ferguson-sone 1) er valgfri.

FÔRING

Froskene spiser små levende leddyr: bananfluer (*Drosophila melanogaster* og til de voksne også *D. hydei*), spretthaler, mikrogresshopper, små isopoder og siktet engplankton. Arten er liten, så de minste fôrdyrene er de viktigste.

ATFERD OG HÅNDTERING

Ameerega rubriventris er dagaktiv og holder til på skogbunnen, men klatrer gjerne. Hannen kaller med en fugleaktig pipelyd, oftest 2-3 korte fløyt på rad.

NATURLIG UTBREDELSE

Peru.