herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega trivittata

Ameerega trivittata er en stor, dagaktiv pilgiftfrosk på 4-6 cm fra skogbunnen i Amazonas. Den er svart med to lysegrønne striper langs sidene, og hannen bærer ofte 15-30 rumpetroll på ryggen til vann i én omgang. Frosken krever et romsligere terrarium enn de små pilgiftfroskene.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Three-striped Poison Frog Tidligere navn: *Epipedobates trivittatus; Dendrobates trivittatus; Phobobates trivittatus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-6 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**70 × 50 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**12-24 mnd.**
Egg per legging	**15-40**
Klekking	**15-22 dager**
Larvetid	**40-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et terrarium på minst 70 × 50 × 50 cm (lengde, bredde, høyde) passer til to voksne *Ameerega trivittata*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen holdes på 23-25 °C, og om natten senkes den med 3-4 °C til omtrent 19-22 °C. Svingningen over året skal være liten, 1-2 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 80-90 % mesteparten av dagen, nær 100 % morgen og kveld, og den kan falle til omtrent 70 % midt på dagen. Lengre tid under 70 % er farlig, særlig hvis frosken ikke har tilgang til vann.
VANN OG VANNKVALITET	En lav vannskål med 1-2 cm vann er nok. Skålen skal være så lav at en unge kan komme seg opp av den, og med stein eller mose i kanten. Skål og vann skiftes ofte, og skålen rengjøres med varmt vann uten såpe.
LYS OG UVB	UVB er ikke dokumentert som nødvendig for pilgiftfrosker generelt, og for akkurat denne arten finnes det ingen opplysninger. Et svakt UVB-lys (Ferguson-sone 1) er valgfritt.
FÔRING	Kosten består av små levende leddyr.
ATFERD OG HÅNDTERING	Hannene roper høyt og forsvarer små territorier, mens hunnene er rolige. Det er ikke dokumentert hvordan arten oppfører seg i grupper i fangenskap, så par er den sikreste holdformen.
NATURLIG UTBREDELSE	Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela.