herpy

PILGIFTFROSKER

Andinobates claudiae

Andinobates claudiae ble beskrevet som den minste pilgiftfrosken: voksne dyr måler bare omtrent 13 mm. Den lever i løvlaget i lavlandsskog i Bocas del Toro i det nordvestlige Panama, både på øyene og på fastlandet. Arten er truet, og det finnes nesten ingen kunnskap om stell og hold.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Bocas Poison Frog Tidligere navn: *Ranitomeya claudiae* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-8**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes nesten ingen kunnskap om stell og hold av *Andinobates claudiae*. Stellet bygger på leveområdet: varm, fuktig lavlandsskog med regn mesteparten av året og et tykt løvlag.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal være 22-25 °C og natten 19-22 °C. Tallene er lånt fra *Ranitomeya imitator*, som trives best ved 21-24 °C og tåler 18-27 °C. Over 29 °C er farlig, så terrariet må ikke stå i sol eller tett på en varmekilde.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 80-100 %. Spray terrariet 1-2 ganger om dagen med regnvann eller osmosevann, slik at løvet holdes fuktig, eller bruk et regnanlegg på timer. Bunnen skal være fuktig, men aldri stå under vann.

VANN OG VANNKVALITET

De voksne froskene trenger ingen vannskål; de får vann gjennom huden fra spraying og det fuktige løvet.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og lever i skygge på skogbunnen. LED-belysning i omtrent 12 timer om dagen er nok til plantene. UVB er ikke nødvendig; et svakt UVB-lys i Ferguson-sone 1 kan brukes hvis det er rikelig med skygge.

FÔRING

Andinobates claudiae er så liten at fôrdyrene må være de minste som finnes: spretthaler, små vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og små isopoder. Selv vanlige bananfluer kan være for store.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er dagaktiv og holder seg i løvlaget og ved skjulestedene. Hannene kaller fra faste steder og forsvarer området sitt, så holdformen er et par. Flere hanner i samme terrarium gir stress og kamper. Froskene skal ikke håndteres.

NATURLIG UTBREDELSE

Panama.