herpy

PILGIFTFROSKER

Andinobates minutus

Andinobates minutus er en av de minste pilgiftfroskene, bare 13-16 mm fra snute til kloakk. Den lever i løvlaget i fuktig lavlandsskog fra det sentrale Panama til Colombias stillehavskyst, og hannen bærer rumpetrollene opp i bromelier. Arten samles ikke inn for dyrehandel og holdes neppe, så det finnes bare lite kunnskap om stell og hold.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Blue-bellied Poison Frog Tidligere navn: *Ranitomeya minuta; Dendrobates minutus; Minyobates minutus*
Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-8**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om stell og hold av *Andinobates minutus*. Stellet bygger på leveområdet: varm, fuktig lavlandsskog med regn mesteparten av året og et tykt løvlag.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen skal være 22-25 °C og natten 19-22 °C. Tallene er lånt fra *Ranitomeya imitator*, som trives best ved 21-24 °C og tåler 18-27 °C. Over 29 °C er farlig, så terrariet må ikke stå i sol eller tett på en varmekilde.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 80-100 %. Spray terrariet 1-2 ganger om dagen med regnvann eller osmosevann, slik at løvet holdes fuktig, eller bruk et regnanlegg på timer. Bunnen skal være fuktig, men aldri stå under vann.

VANN OG VANNKVALITET
De voksne froskene trenger ingen vannskål; de får vann gjennom huden fra spraying og det fuktige løvet.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og lever i skygge på skogbunnen. LED-belysning i omtrent 12 timer om dagen er nok til plantene. UVB er ikke nødvendig; et svakt UVB-lys i Ferguson-sone 1 kan brukes hvis det er rikelig med skygge.

FÔRING
I naturen lever *Andinobates minutus* av midd, maur, spretthaler og insektlarver. Arten er så liten at fôrdyrene må være de minste som finnes: spretthaler, små vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og små isopoder.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten er dagaktiv og holder seg i løvlaget og ved skjulestedene. Hannene kaller fra faste steder og forsvarer området sitt, så holdformen er et par. Flere hanner i samme terrarium gir stress og kamper. Froskene skal ikke håndteres.

NATURLIG UTBREDELSE
Colombia og Panama.