herpy

PILGIFTFROSKER

Andinobates tolimensis

Andinobates tolimensis er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 17-19 mm med brun rygg og metallskinnende gulbronse hode. Den er bare kjent fra et lite stykke tåkeskog i det nordlige Tolima i Colombia, ble først beskrevet i 2007 og holdes neppe. Stellet bygger derfor på leveområdets kjølige, fuktige fjellklima.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya tolimense; Ranitomeya tolimensis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**17-19 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**19-23 °C**
Temperatur, natt	**15-19 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-2**
Klekking	**16-24 dager**
Larvetid	**108-152 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om stell og hold av *Andinobates tolimensis*, og arten holdes neppe i fangenskap. Stellet bygger på leveområdet: kjølig, fuktig tåkeskog med tett løvlag, mose, dødt tre og bromelier.

TEMPERATUR
Temperaturen er ikke målt i artens leveområde. 19-23 °C om dagen og 15-19 °C om natten passer til tåkeskog i omtrent 1.800 m høyde.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 85-100 % hele året, og løvlaget skal være konstant fuktig. Spray minst to ganger om dagen eller bruk et tåkeanlegg, og la overflatene tørke litt mellom sprayingene, slik at det ikke oppstår mugg.

VANN OG VANNKVALITET
Arten skal ikke ha en vanndel. Vannet finnes i bromeliers bladkar, hvor rumpetrollene vokser opp, og det skal skiftes jevnlig, slik at det ikke blir grumset. Bruk osmosevann, regnvann eller avklorert springvann.

LYS OG UVB
A. tolimensis lever i en tett skog med lite lys ved bakken, så lyset er først og fremst til plantene. Gi 10-12 timers lys om dagen med LED eller lysstoffrør og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten har behov for UVB.

FÔRING
Fôret er små leddyr: de minste spretthalene og bananfluene (*Drosophila*) og små skrukketroll. Fôr 3-4 ganger i uken, og la det alltid være levende fôrdyr i terrariet.

ATFERD OG HÅNDTERING
Atferden i fangenskap er ikke dokumentert. Frosken lever på skogbunnen i skygge og skjuler seg i hull mellom røttene, i løv og mose. Hannen kaller fra bakken.

NATURLIG UTBREDELSE
Colombia.