herpy

PILGIFTFROSKER

Andinobates virolinensis

Andinobates virolinensis er en liten, dagaktiv pilegiftfrosk på opptil 19 mm med skarlagenrødt hode og forkropp og brun bakkropp. Den finnes bare i tåkeskogen på den østlige Andeskjeden i Colombia. Arten er sårbar i naturen og holdes neppe, så stellet bygger på det kjølige, fuktige fjellklimaet i leveområdet.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Santander Poison Frog Tidligere navn: *Ranitomeya virolinensis; Dendrobates virolinensis; Minyobates virolinensis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**19 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**19-23 °C**
Temperatur, natt	**15-19 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-2**
Klekking	**16-24 dager**
Larvetid	**108-152 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes lite kunnskap om stellet av *Andinobates virolinensis*, og arten holdes neppe i fangenskap. Stellet bygger på leveområdet: kjølig, fuktig tåkeskog med tykt løvlag og bromelier.

TEMPERATUR
Temperaturen er ikke målt i artens leveområde. 19-23 °C om dagen og 15-19 °C om natten passer til tåkeskog i 1.300-2.400 m høyde.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 85-100 % med et fuktig løvlag hele året.

VANN OG VANNKVALITET
Arten skal ikke ha en vanndel. Vannet finnes i bladtraktene til bromeliene, der rumpetrollene vokser opp, og det må skiftes jevnlig, slik at det ikke blir grumset. Bruk osmosevann, regnvann eller avklort springvann.

LYS OG UVB
A. virolinensis lever på skogbunnen i skygge, så lyset er først og fremst til plantene. Gi 10-12 timer lys om dagen med LED eller lysrør og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB.

FÔRING
Føden er små leddyr: spretthaler og bananfluer (*Drosophila*) i den minste størrelsen og små skrukketroll. Fôr 3-4 ganger i uken, og la det alltid være levende fôrdyr i terrariet.

ATFERD OG HÅNDTERING
Atferden i fangenskap er ikke dokumentert. I naturen deler flere voksne samme bromelia, så arten tåler trolig selskap og kan holdes i par eller en liten gruppe.

NATURLIG UTBREDELSE
Colombia.