herpy

PILGIFTFROSKER

Epipedobates boulengeri

Epipedobates boulengeri er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på omtrent 17-24 mm med mørkebrun rygg og en hel, lys stripe langs siden. Den lever i lavlandsregnskogen langs Stillehavskysten fra det sørvestlige Colombia til det nordvestligste Ecuador. Arten holdes neppe, og det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Marbled Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates boulengeri; Phyllobates boulengeri* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**17-24 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**10-30**
Klekking	**9-14 dager**
Larvetid	**42-70 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Epipedobates boulengeri*, og arten holdes neppe.
TEMPERATUR	Hold 22-26 °C om dagen med litt kjøligere og litt varmere steder i terrariet, og 19-22 °C om natten. Det klarer seg normalt med romtemperatur og belysningen; varmematter er unødvendige.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 80-100 %. Sprøyt flere ganger om dagen eller bruk et regnanlegg, for eksempel tre ganger daglig i 20-60 sekunder, gjerne supplert med en forstøver.
VANN OG VANNKVALITET	En flat vannskål med 1-2 cm vann, for eksempel en lav skål eller et halvt paranøttskall, gir froskene et sted å drikke og bade og er yngleplass når hannen skal sette av rumpetroll. Skålen skal være lett å komme seg opp av.
LYS OG UVB	Lyset er til plantene: lysstoffrør eller LED-lister i omtrent 12 timer om dagen. De nærstående artene trives uten UVB, så det er valgfritt. Vil man gi det, hold deg til Ferguson-sone 1 med rikelig skygge og tett løv.
FÔRING	Froskene får levende, små byttedyr: spretthaler og bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og voksne tar i tillegg den større *Drosophila hydei* og nyklekte sirisser.
ATFERD OG HÅNDTERING	Slektens arter er dagaktive, bakkelevende og territoriale, og hannene kaller fra faste plasser. Kallet er ikke nærmere beskrevet for *E. boulengeri* i snever forstand.
NATURLIG UTBREDELSE	Colombia og Ecuador.