herpy

PILGIFTFROSKER

Excidobates captivus

Excidobates captivus er en svært liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 12-17 mm fra grenseområdet mellom Peru og Ecuador. Den er svart med oransjerøde flekker i rader langs ryggen og gule flekker på lemmer og mage, og den lever på skogbunnen i fuktig regnskog og fjellskog.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Rio Santiago Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates captivus; Ranitomeya captiva; Adelphobates captivus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-17 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**4-8**
Larvetid	**65-75 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Excidobates captivus*. Arten lever på skogbunnen i varm til mild, vedvarende fuktig skog.

TEMPERATUR
Temperaturen på artens lokaliteter er ikke målt. 22-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten ligger mellom klimaet i lavlandet og i 800-1200 m høyde. Små pilgiftfrosker tåler varme dårlig, så unngå lengre perioder over 28 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 80-100 %, og bunnen skal være fuktig hele året. Sprøyt med osmose- eller regnvann en til to ganger daglig, eller bruk et regn- eller tåkeanlegg. Sørg for at lufta ikke står stille.

VANN OG VANNKVALITET
En vannskål er ikke nødvendig, fordi froskene får fukt fra sprøytingen og det fuktige løvlaget. Vannet i bromelier og filmbokser skiftes med friskt osmose- eller regnvann hver uke.

LYS OG UVB
Arten lever i skygge på skogbunnen, så lyset skal først og fremst gi plantevekst og en dag på 12 timer. UVB er ikke nødvendig, men valgfritt.

FÔRING
Excidobates captivus er så liten at den bare kan ta svært små fôrdyr: spretthaler, vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og de minste gråsuggene. Fôr voksne og unger daglig med så mye som blir spist.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten er dagaktiv, men skjuler seg mye i løvet. Hannen roper korte, skingrende lyder fra skjulte plasser. Den holdes best som par, fordi flere dyr sammen kan gi strid.

NATURLIG UTBREDELSE
Peru og Ecuador.