herpy

PILGIFTFROSKER

Mannophryne trinitatis

Mannophryne trinitatis er en liten, brun og dagaktiv frosk på 25-28 mm som bare finnes på Trinidad, der den lever ved klare, steinete bekker i fuktig skog. Hannen kan bli kullsvart når han kaller, og hunnen har en klar gul strupe. Arten holdes neppe, og det finnes lite kunnskap om stell av den.

Familie: Aromobatidae Engelsk: Trinidad Poison Frog Tidligere navn: *Phyllobates trinitatis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**25-28 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vanndel** dybde 3-5 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**6-13**
Klekking	**21 dager**
Larvetid	**40-50 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes lite kunnskap om stell av *Mannophryne trinitatis*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 23-27 °C og natten 20-22 °C. Frosker fra skogsbekker tåler varme dårlig, så hold temperaturen under 28 °C. Arten har ingen vinterdvale, men i naturen er det en tørrere tid fra januar til mai.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 80-100 %. Sprøyt daglig, slik at blader og steiner er våte. Et tåkeanlegg gjør det lettere å holde fuktigheten stabil. Sørg for ventilasjon, slik at luften ikke blir stillestående.
VANN OG VANNKVALITET	Arten trenger en fast vanndel med grunt, rent og gjerne svakt rennende vann, 3-5 cm dypt, med steiner og blader. En liten pumpe kan gi litt strøm, og froskene må lett kunne komme opp på land.
LYS OG UVB	UVB er neppe nødvendig, men en lav dose (Ferguson-sone 1) er valgfri. Planlys i 10-12 timer holder mose og bregner i live. Gi skygge med planter og bark, slik at froskene kan trekke seg bort fra det skarpe lyset.
FÔRING	Arten trenger små leddyr: små og store bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *Drosophila hydei*), springhaler og små gråsugger.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Mannophryne trinitatis* er dagaktiv og territorial. Hunnene forsvarer plassene sine oftere enn hannene, med trusler, bryting og jaging, og de viser den gule strupen som trussel.
NATURLIG UTBREDELSE	Trinidad og Tobago.