herpy

PILGIFTFROSKER

Oophaga lehmanni

Oophaga lehmanni er en sjelden, dagaktiv pilgiftfrosk fra et lite område i det vestlige Colombia, svart eller mørkebrun med brede bånd av rødt, oransje eller gult. Den er kritisk truet i naturen, og bare oppdrettede dyr hører hjemme i et terrarium. Arten krever en erfaren holder: den tåler ikke varme, og rumpetrollene lever utelukkende av ubefruktede egg fra hunnen.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Lehmann's Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates lehmanni* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**4-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På blader over vann**
Egg per legging	**3-10**
Klekking	**14-28 dager**
Larvetid	**60-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Vokter eggene, bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

STELL

Min. terrarium	**60 × 60 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-24 °C**
Temperatur, natt	**17-19 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par av *O. lehmanni* skal ha et terrarium på minst 60 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre: de få dokumenterte oppdrettene har alle lykkes i større terrarier.
TEMPERATUR	*O. lehmanni* kommer fra kjølig fjellregnskog og er mer følsom for varme enn de fleste pilgiftfrosker. Den trives best ved 22-24 °C i dagtimene, og 24-25 °C bør ikke overskrides, heller ikke i kort tid.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %: høy morgen og kveld, gjerne med tåke, slik at den når opp i 100 %, og litt lavere midt på dagen, ned til omkring 70 %.
VANN OG VANNKVALITET	Froskene trenger ikke en vannskål, fordi fuktigheten dekker behovet deres.
LYS OG UVB	Frosken er dagaktiv og lever i skygge under skogens løvtak. Det er ingen dokumentasjon for at arten trenger UVB når fôret drysses med D3-vitamin, men svak UVB-belysning (Ferguson-sone 1) kan brukes uten skade.
FÔRING	*O. lehmanni* spiser bare levende, små leddyr. Hovedfôret er flygeløse bananfluer, og arten er stor nok til også å ta de større *Drosophila hydei*.
ATFERD OG HÅNDTERING	*O. lehmanni* er dagaktiv og rolig, men hannene er territoriale og kaller fra faste plasser. Hold arten parvis. Hanner er svært aggressive mot hverandre og undertrykker hverandre, og den underlegne hannen kan dø av stress.
NATURLIG UTBREDELSE	Colombia.