herpy

PILGIFTFROSKER

Phyllobates aurotaenia

Phyllobates aurotaenia er en dagaktiv pilgiftfrosk på 3-4 cm fra stillehavskysten av Colombia, svart med to grønne til gylne striper langs ryggen. Ville dyr bærer en dødelig hudgift, men oppdrettede dyr er ugiftige. Arten er dristig, roper høyt og er lett å få til å yngle.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Kokoe Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates aurotaenia* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**8-10 mnd.**
Egg per legging	**8-28**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par eller en liten gruppe *Phyllobates aurotaenia* trenger et regnskogsterrarium på minst 60 × 45 × 45 cm til opptil 4 voksne dyr.
TEMPERATUR	*Phyllobates aurotaenia* trives best kjølig. Dagtemperaturen skal ligge på 21-24 °C, og om natten senkes den til 18-21 °C. Arten tåler 18-27 °C, men over 27 °C er farlig, og slekten er kjent for å tåle varme dårlig.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. Arten tåler kortvarig ned til 50 % hvis den har tilgang til vann, men lav fuktighet uten vann kan raskt bli dødelig.
VANN OG VANNKVALITET	En lav vannskål med 1-2 cm vann og en stein eller en skrå kant, slik at froskene lett kommer opp, er nok.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremst til plantene. Lysstoffrør eller LED-lys på omtrent 6.500 K gir naturlige farger og god plantevekst, og omtrent 12 timer lys om dagen er vanlig.
FÔRING	*Phyllobates aurotaenia* spiser små leddyr. Unger tar vingeløse *Drosophila melanogaster*, mens voksne dyr gjerne spiser større fôrdyr som *Drosophila hydei* og helt små siklader.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Phyllobates aurotaenia* er dagaktiv og dristig, men sky som ung.
NATURLIG UTBREDELSE	Colombia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/pilegiftfroeer/phyllobates-aurotaenia