herpy

PILGIFTFROSKER

Phyllobates bicolor

Phyllobates bicolor er en gul til oransje pilgiftfrosk på 3-5 cm fra regnskogen i det vestlige Colombia, ofte med svarte eller grønnaktige bein. I naturen er den et av de giftigste dyrene man kjenner, men oppdrettede dyr er ugiftige. Den er dristig, nysgjerrig og nesten alltid fremme, og den yngler villig i terrariet.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Black-legged Poison Dart Frog Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-5 cm** snute-kloakk-lengde
Vekt	**4,5 g**
Levealder	**6-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**12 mnd.**
Egg per legging	**4-30**
Klekking	**13-14 dager** ved 21-23 °C
Larvetid	**21-60 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par *Phyllobates bicolor* trenger et regnskogsterrarium på minst 50 × 50 × 50 cm.
TEMPERATUR	Angivelsene for dagtemperaturen varierer fra 21-23 °C til 23-26 °C, så 21-25 °C er en sikker ramme. Om natten senkes temperaturen 3-4 grader, til 18-21 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-80 % midt på dagen og opp mot 100 % morgen og kveld. Et regnanlegg og et tåkeanlegg på timer gjør det lettest, og tåken får tydelig froskene til å kalle og bevege seg.
VANN OG VANNKVALITET	Arten setter pris på en vannflate i terrariet. Gi en eller flere små vannskåler med 1-2 cm vann som dyrene lett kommer opp av, eller en liten vanndel foran ruten med avløp, slik at vannet lett kan skiftes.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremst til plantene. Lysstoffrør eller LED i omtrent 12 timer om dagen er nok.
FÔRING	*Phyllobates bicolor* foretrekker små fôrdyr på høyst omtrent 3 mm.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Phyllobates bicolor* er dagaktiv, svært aktiv og nysgjerrig og nesten alltid å se. Hannene kaller høyt med trillende, summende toner, noen ganger i flere dager av gangen.
NATURLIG UTBREDELSE	Colombia.