herpy

PILGIFTFROSKER

Phyllobates terribilis

Phyllobates terribilis er den største av pilgiftfroskene, 4-5 cm, og i naturen et av de giftigste dyrene man kjenner. Den lever bare i et lite stykke regnskog ved Colombias stillehavskyst. Oppdrettede dyr er praktisk talt ugiftige, dristige og alltid fremme, og arten er blitt en av terrarieholdernes mest holdte pilgiftfrosker.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Golden Poison Frog Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-5 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**16-20 mnd.**
Egg per legging	**10-30**
Klekking	**10-25 dager** ved 22-24 °C
Larvetid	**30-60 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**60 × 50 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par *Phyllobates terribilis* trenger et terrarium på minst 50 × 50 × 50 cm, gjerne 60 cm i alle mål, og 60 × 50 × 80 cm eller 80 × 50 × 80 cm til grupper på 5-10 dyr.

TEMPERATUR

Angivelsene varierer: 16-27 °C med omkring 21-24 °C som ideelt, 18-24 °C om dagen og ned til 16 °C om natten og aldri over 27 °C, eller 22-24 °C nede ved bunnen og 30-32 °C i de høyeste, mest utsatte sonene under en liten spot på for eksempel 35 W, men ikke over 30 °C i hele terrariet.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være høy, 70-100 %, men bunnen må ikke bli sumpete. Et regnanlegg er det enkleste, for eksempel med tre sprøytinger om dagen på 20-60 sekunder, avhengig av dysene.

VANN OG VANNKVALITET

Gi en eller flere små vannskåler med omkring 2 cm vann, for eksempel underskåler eller halve paranøttskall, som dyrene lett kommer opp av.

LYS OG UVB

Lyset er først og fremst til plantene. Lysstoffrør eller LED-lister i omkring 12 timer om dagen er nok, og dagslengden kan gjerne variere litt gjennom året.

FÔRING

Phyllobates terribilis tar større bytte enn de fleste pilgiftfrosker. I naturen er maur hovedføden, men den tar mange slags små leddyr.

ATFERD OG HÅNDTERING

Phyllobates terribilis er dagaktiv, dristig og nysgjerrig og er fremme mesteparten av dagen med en kort pause midt på dagen. Hannene kaller med en myk, fuglelignende trille, særlig etter sprøyting.

NATURLIG UTBREDELSE

Colombia.