herpy

PILGIFTFROSKER

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata er en av de minste artene i slekten: bare 15-17 mm fra snute til kloakk. Den er skarpt gul med svart tegning, brune bein og lyseblå buk og kommer fra regnskogen nær Iquitos i nordøstlige Peru. Den er dagaktiv og litt sky, yngler villig i filmbokser og bromelier og er et godt valg for en holder med litt erfaring.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Tahuayo Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates flavovittatus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-17 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Kjønnsmoden	**5-8 mnd.**
Egg per legging	**2-6**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr og ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par *R. flavovittata* kan holdes i et terrarium på 30 × 30 × 45 cm, og samme størrelse kan rumme 2-3 voksne dyr. Andre angivelser anbefaler 45 × 45 × 45 cm til 1-3 frosker og omtrent 20 liter per frosk i en gruppe.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Arten trives best rundt 21-24 °C og tåler 18-27 °C. Nattemperaturen er ikke oppgitt særskilt for arten og er lånt fra beslektede arter.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 70-100 %; noen angivelser foretrekker 80-100 %. Arten kan kortvarig klare omtrent 50 % hvis den har tilgang til rent vann, men det er en nødløsning og kan være dødelig hvis det varer ved.

VANN OG VANNKVALITET

Gi froskene en lav vannskål eller et lite vannparti, og hold vannet så lavt at den minste frosken kan sitte med hode og overkropp over vannet: arten svømmer dårlig. Vanndybden bør være 1-2 cm.

LYS OG UVB

Froskene er dagaktive og lever i skyggen i regnskogen. Lyset er først og fremst til plantene: LED-lys 12-14 timer om dagen er passende. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB, og det brukes vanligvis ikke.

FÔRING

R. flavovittata er så liten at den bare kan ta små fôrdyr. Unger og de fleste voksne spiser vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også ta *D. hydei* og nyklekte siklader.

ATFERD OG HÅNDTERING

R. flavovittata er dagaktiv, rask og litt sky. Froskene blir dristigere hvis terrariet er tett beplantet og har mange skjul, og de venner seg til deg hvis du ser på dem gjennom glasset. Hannene roper fra åpne plasser.

NATURLIG UTBREDELSE

Peru.