herpy

PILGIFTFROSKER

Ranitomeya reticulata

Ranitomeya reticulata er en av de minste pilgiftfroskene: bare 13-17 mm, med kobberrød til oransje rygg og blågrå bein med svart nettmønster. Den lever i lavlandsskogen i Amazonas i nordøstlige Peru og østlige Ecuador. I terrariet er den dristig og livlig, men krevende, fordi eggene er vanskelige å finne og ungene er vanskelige å få til å vokse opp.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Red-backed Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates reticulatus* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-17 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-8**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par *R. reticulata* kan holdes i et terrarium på 30 × 30 × 45 cm, som også rommer 2-3 dyr. Angivelsene går opp til 40 × 40 × 40 cm til et par eller en trio, og et par er også holdt med godt resultat i 40 × 50 × 40 cm.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 22-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten trives best rundt 21-24 °C og tåler 18-27 °C, mens temperaturer over 29 °C kan være dødelige. Et par er holdt og har ynglet ved 22-26 °C i luft og vann.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. En god rytme er nesten 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen, slik at terrariet tørker litt opp mellom sprøytingene.
VANN OG VANNKVALITET	En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok.
LYS OG UVB	*R. reticulata* er dagaktiv, og lyset er først og fremst til plantene. Gi 12-14 timer lys om dagen, for eksempel LED fra kl. 8 til 20, og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB.
FÔRING	Grunnfôret er små leddyr. Unger og de fleste voksne tar vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også ta den større *D. hydei*.
ATFERD OG HÅNDTERING	*R. reticulata* er lynrask og dristig og sees ofte fritt fremme, som om den ikke aner hvor liten den er. Hannene roper fra faste plasser med en høy, kort summing.
NATURLIG UTBREDELSE	Peru og Ecuador.