herpy

PILGIFTFROSKER

Ranitomeya summersi

Ranitomeya summersi er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 16-21 mm fra Huallaga-dalen i Peru, oransje eller kobberfarget med svart marmorering og en svart maske over øynene. Arten er truet i naturen, eggene er vanskelige å finne, og froskene er raske og sky, så den egner seg best for en holder med erfaring med pilgiftfrosker.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Summers' Poison Dart Frog Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**16-21 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**4-9**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et par eller en liten trio av *R. summersi* kan holdes i et terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Arten trives best rundt 21 °C og kan overleve 18-27 °C. Temperaturer over 29 °C kan være dødelige.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. En god rytme er nær 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen, slik at terrariet kan tørke litt opp mellom sprøytingene.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok.

LYS OG UVB
R. summersi er dagaktiv, og lyset er først og fremst til plantene. Gi 12-14 timer lys om dagen og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB.

FÔRING
Grunnfôret er små levende leddyr. Unger og unge dyr tar vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også ta den større *D. hydei*.

ATFERD OG HÅNDTERING
R. summersi er dagaktiv, rask og ofte sky, men kan bli dristigere når den har vent seg til terrariet. Man ser mest til dem i et tett beplantet terrarium med gjemmesteder. Hannen roper fra et åpent sted med et mykt, summende rop.

NATURLIG UTBREDELSE
Peru.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/pilegiftfroeer/ranitomeya-summersi