herpy

PILGIFTFROSKER

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 17-19 mm fra vestlige Amazonas. Den lever i trærne og oppdretter yngelen i vann som samler seg i bromelier. Hunnen fôrer rumpetrollene med ubefruktede egg.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Brazilian Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates vanzolinii* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**17-19 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-6 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Temperatur, natt	**19-23 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Egg per legging	**1-6**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr og ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et terrarium på 40 × 40 × 40 cm er minimum for et par *Ranitomeya vanzolinii*, og angivelsene går opp til 50 × 50 × 50 cm.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal ligge på 23-26 °C, og om natten senkes den med 3-4 °C til 19-23 °C. Svingningen gjennom året skal være liten, 1-2 °C. Varmeflekk er ikke nødvendig, og arten har ingen vinterhvile.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 70-100 %. Morgen og kveld bør den ligge nær 100 %, og ved middagstid kan den falle til 70-75 %. Terrariet sprøytes daglig, helst morgen og kveld, med osmose- eller regnvann.

VANN OG VANNKVALITET

En vannskål er ikke nødvendig for de voksne dyrene, men er en fordel, og den kan være lav med 1-2 cm vann.

LYS OG UVB

Lysbehovet for *Ranitomeya vanzolinii* er beskjedent. Frosken trenger nok lys til å se fôret sitt, og plantene trenger mer. En LED-belysning til planter eller et lysrør, tent 12-14 timer i døgnet, er passende.

FÔRING

Ranitomeya vanzolinii lever av små, levende leddyr: bananfluer, spretthaler, små tropiske bænkebitere og nyklekte siklader. Små dyr krever små fôrdyr.

ATFERD OG HÅNDTERING

Ranitomeya vanzolinii er dagaktiv, men sjenert. I et tett beplantet terrarium med mange skjulesteder viser den seg oftere enn i et sparsomt innredet. Frosken har et trillende rop, som mest høres om morgenen og kvelden.

NATURLIG UTBREDELSE

Brasil og Peru.